

moins que chez l'*A. lacrymosa*, i. sp. Yeux situés aux  $\frac{2}{5}$  antérieurs. Bord antérieur de l'épistomie un peu prolongé en lobe arrondi. Trois ocelles peu distincts. Un sillon frontal plutôt élevé. Antennes exactement comme chez l'*A. aurita*, mais les articles du funicule sont tous plus courts et plus fortement clavés. Le second article du funicule est aussi long que le premier, tandis qu'il est plus court chez l'*A. lacrymosa*, i. sp.; les articles 8 à 11 à peine moins de deux fois plus longs qu'épais. Profil du pronotum légèrement concave. Mésonotum allongé, fortement bossu, avec une légère impression médiane transversale qui le rend faiblement bigibbeux. Les deux stigmates supérieurs du mésonotum, qui est très bas et plat, proéminent au profil dorsal et séparent les deux faces, dont la basale est la plus longue, et la déclive très faiblement inclinée. Pédicule avec un nœud cunéiforme obtus, très bas et très épais, avec un pan antérieur court et un pan postérieur long (comme sur la figure de l'*A. aurita* ♀ d'Emery). Abdomen plutôt grand. Pattes et antennes longues et grêles, plus que chez l'*A. lacrymosa*, i. sp.

Luisante, finement ponctuée. Pilosité dressée à peu près nulle. Un fin duvet de pubescence jaunâtre recouvre tout le corps, les pattes et les antennes; sur les scapes il est oblique, soulevé. Entièrement d'un jaune testacé terne et sale, souvent brunâtre ou même brune. Funicules et pattes brunâtres plus foncés.

♂ *minor*. Diffère de la ♀ major par sa couleur entièrement d'un brun foncé, avec le devant de la tête d'un brun rougeâtre, et par sa tête bien plus longue que large, à peine élargie et moins échancrée derrière. Les côtés de la tête sont presque parallèles et fort peu convexes. L'impression transversale du mésonotum est à peine marquée.

*Hab.* AMAZONES, Pará (*Dr. A. Göldi*).

Rapprochée de l'*A. aurita*, dont il faudrait connaître l'ouvrière. Distincte par sa pilosité, sa sculpture et sa forme. La longueur relative des tibias et des scapes est comme chez l'*A. aurita*.

Elle est plus éloignée de l'*A. trigona* et plus rapprochée de l'*A. aurita* que l'*A. lacrymosa*, i. sp., au point de vue de la forme. Sa tête est plus déprimée que chez l'*A. trigona* (l'*A. lacrymosa*, i. sp., tient le milieu). Mais les comparaisons avec l'*A. aurita* n'ont guère de valeur, tant qu'on ne saura pas quelle est l'ouvrière de cette espèce. Les *A. festai*, Emery, et *A. lallemandi*, Forel, sont des espèces voisines.]

### 17. *Azteca chartifex*.

*Azteca chartifex*, Forel, Boll. Mus. Zool. Torino, xi. no. 230, p. 4, nota, figg. 5 (1896)<sup>1</sup>.

*Hab.* TRINIDAD<sup>1</sup>.

Race *laticeps*, n. st.

♂. Cette race forme un passage entre l'*A. chartifex*, r. *multinida*, et l'*A. festai*, Emery. Elle est plus petite (2.5 à 3.2 millim.) que l'*A. festai*, a la tête moins courte et moins large, à côtés moins convexes; mais tous ces caractères sont au contraire plus accentués que chez l'*A. chartifex* et la r. *multinida*. Le mésonotum est assez abruptement tronqué derrière, comme chez la r. *multinida*, tandis qu'il est bossu chez l'*A. festai*.

*Hab.* COSTA RICA (*Tonduz*); PANAMA, Bugaba, Volcan de Chiriqui (*Champion*).

"Makes a large nest on smooth-barked trees (*Psidium*, sp.), the nest hanging to the underside of a branch or flat on the surface of the trunk" (*Champion*).

J'ai trouvé en Colombie le nid d'une race nouvelle de l'*A. chartifex* \* en forme d'ellipse

\* *Azteca chartifex*, race *multinida*, n. st.

♂. Long. 2.3 à 2.9 millim. À peine ou pas dimorphe. Tête bien plus rétrécie derrière et à côtés plus convexes que chez l'*A. chartifex* typique et que chez les races *stalactitica* et *severini*, Emery. Plus