

allongée, gros à peine comme le poing, et entourant les rameaux terminaux des branches d'un grand arbre qui surplombaient le sentier. Il y en avait plusieurs, les uns près des autres, appartenant évidemment à la même colonie (sur les divers rameaux de la même branche). Je réussis à en attraper deux. Les ouvertures sont très petites, comme les habitants.

18. *Azteca festai*.

Azteca festai, Emery, Boll. Mus. Zool. Torino, xi. p. 4 (1896) ¹.

♂. Robuste. Long. 2.7 à 4.1 millim.

♀ *major*. Tête (sans les mandibules) longue de 1.05, large de 1.25 millim. (maxima longue de 1.1, large de 1.35 millim.). Mandibules lisses, luisantes, ponctuées, armées de 9 dents, à bord terminal droit (concave chez les *A. aurita*, *A. trigona* ♀ (?), *A. lacrymosa*, etc., où elles sont mates et striées). Bord antérieur de l'épistome largement échancré au milieu, presque droit, à peine bisinué. Tête extrêmement rétrécie devant, rétrécie derrière, convexe en dessus, à côtés très convexes, beaucoup plus large que longue, fortement échancrée derrière, avec deux lobes occipitaux très larges et très convexes. Yeux grands et aplatis, un peu en avant du milieu des côtés. Une forte impression au milieu du front, derrière (place de l'ocelle antérieur). Aire frontale très grande, mais très indistincte. Arêtes frontales très écartées. Scapes dépassant un peu l'occiput. Articles 8 à 10 du funicule un peu plus épais que longs. Pronotum et mésonotum formant une très forte convexité; ce dernier plus long que large. Métanotum bas; face basale plate; stigmates aux angles; face déclive courte, oblique. Écaille très inclinée, tranchante, basse, étroite en haut, plane derrière, subverticale devant (anguleuse). Abdomen assez grand. Pattes médiocres. Comme chez le groupe des *A. lacrymosa* et *A. trigona* ♀ (?), le thorax, quoique bossu devant, n'a pas d'échancrure méso-métanotale.

Luisante, très finement ponctuée, finement et assez abondamment pubescente. Pilosité dressée très épars sur le corps, nulle sur les tibias et les scapes. D'un brun noirâtre. Devant de l'épistome, bord des mandibules et tarses d'un brun roussâtre. Pattes et antennes brunes.

♀ *minor*. Tête à peu près aussi longue que large, moins convexe et moins rétrécie en tout sens, cependant encore fortement rétrécie devant et légèrement derrière. Elle est encore fortement échancrée et convexe sur les côtés.

Hab. PANAMA (*Festa* ¹).—COLOMBIE, pied de la Sierra Nevada de Santa Marta (*Forel*).

Le nid de cette singulière espèce n'est guère plus gros que le poing, fait en carton, et se trouvait sur la maîtresse branche d'un petit arbre. Le carton est extrêmement délicat, mince et friable. Les cases et les galeries sont larges, concentriques. Tout le nid est d'une délicatesse extrême; sa surface est élégamment bosselée. Les ♂ m'attaquèrent avec une furie inouïe. Odeur très forte. Les exemplaires de *Dibulla* m'ont été envoyés par M. Henri Lallemand. Je profite de cette occasion pour le

semblable à la *r. laticeps* et l'*A. festai*, dont elle a aussi l'écaille haute et le mésonotum bossu, abrupt derrière. Mais la tête est plus allongée que chez la *laticeps*, les yeux sont plus convexes, l'écaille plus verticale et la taille bien plus petite. Métanotum très bas, comme chez la race *severini*. D'un noir luisant, avec les pattes, les antennes et le devant de la tête bruns.

Hab. COLOMBIE, Ouriheka, près de Rio Frio, Province de Santa Marta (*Forel*).

Pour le nid, voir Tab. II. fig. 3.