

remercier de tout cœur de son aimable réception à son Hacienda de la Esperanza et à son rancho de Dibulla. Je soupçonne fortement l'*A. festai* d'être l'*A. trigona*, ♀.

A. lallemandi, Forel, est un espèce voisine*.

19. *Azteca longiceps*.

Azteca longiceps, Emery, Mem. Accad. Sci. Bologna, (5) iii. p. 344 (♀) (1893)¹.

Hab. GUATÉMALA, Pantaleon (*Champion*) [♀]; COSTA RICA, Alajuela¹.

20. *Azteca bicolor*.

Azteca bicolor, Emery, Mem. Accad. Sci. Bologna, (5) iii. p. 141 (1893)¹.

Hab. GUATÉMALA, Pantaleon (*Champion*); NICARAGUA, Chontales (*Janson*) [♀]; PANAMA, Bugaba (*Champion*) [♂ ♀].—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Paraguay¹.

* *Azteca lallemandi*, sp. n.

Long. 2.4 à 4.5 millim. Plus dimorphe que la précédente et très voisine de l'*A. lacrymosa* et de l'*A. trigona* ♀ (?).

Elle forme un intermédiaire entre ces deux espèces et l'*A. festai*.

♂ *major*. Mandibules à bord terminal nettement concave, avec la dent de l'extrémité longue (comme chez l'*A. lacrymosa*), densément striées et mates, sauf vers le bord terminal. Bord antérieur de l'épistome beaucoup moins convexe devant que chez l'*A. lacrymosa*, à peine avancé. Tête longue de 1.35, large de 1.33 millim. (chez une ♀ maxima longue de 1.4 et large de 1.45 millim.), très convexe en dessus, à côtés très convexes et à échancrure postérieure assez étroite, comme chez l'*A. festai* (large chez l'*A. lacrymosa*). Yeux assez grands, situés au milieu des côtés de la tête. La tête est bien plus rétrécie derrière que chez l'*A. lacrymosa* et a les lobes occipitaux plutôt arrondis, comme chez l'*A. festai*, quoique bien moins larges. Aire frontale petite, distincte; sillon frontal assez distinct, terminé à une faible impression. Tous les articles du funicule au moins un peu plus longs que larges, les 8 à 11 à peine (bien plus longs chez l'*A. lacrymosa*). Les scapes dépassent l'occiput. Pronotum convexe. Le mésonotum forme une gibbosité distincte du pronotum et du métanotum, plus courte que chez l'*A. lacrymosa*. Métanotum moins bas que chez les deux autres espèces, avec les stigmates très proéminents aux angles qui séparent les deux faces, dont la déclive est plus abrupte, à peine moins longue que la basale. Écaille assez basse, assez inclinée, épaisse et très obtuse-arrondie en haut, avec le bord supérieur très épais (presque comme chez l'*A. lanuginosa*, voir fig. Emery). Pattes assez longues. Abdomen assez grand, comme chez l'*A. festai*.

Luisante, très finement ponctuée. Pilosité dressée absolument nulle. Pubescence abondante et plus longue que chez ses voisines, formant sur la tête de jolies petites lignes grises, sinueuses, laissant entre elles de fins espaces glabres.

D'un rouge brunâtre, avec le vertex, l'abdomen, les cuisses, les tibias, le milieu des mandibules et les $\frac{2}{3}$ terminaux des funicules bruns.

♀ *minor*. Tête en trapèze, plus courte et à côtés plus convexes que chez l'*A. lacrymosa*, plus longue et à côtés moins convexes que chez l'*A. festai*. Les autres caractères sont les mêmes que pour la ♀ *major*, aussi la convexité spéciale du métanotum.

Entièrement brune, avec la base des scapes, le devant de l'épistome et le pourtour des mandibules d'un roussâtre sale.

Hab. COLOMBIE, forêt vierge au pied de la Sierra Nevada de Santa Marta (Naranjo) (*Forel*).

Son nid était en carton, gros comme la tête, adossé au tronc d'un *Cecropia*, à une grande hauteur. Je dus faire abattre l'arbre pour l'obtenir. Le nid, qui s'est malheureusement perdu, ressemble plutôt à celui de l'*A. lacrymosa*, mais il est plus petit.