

grêles, dépassent l'occiput de la moitié de leur longueur. Thorax grêle; mésonotum rétréci, plus long que large, avec une large impression transversale qui rend son profil légèrement concave et son bord postérieur légèrement relevé en bourrelet de selle peu marqué, mais assez distinct. Échancrure méso-métanotale large, très marquée, renfermant sur sa face dorsale les deux stigmates qui proéminent. Métanotum court, en bosse arrondie, la face basale étant fortement inclinée en avant. Le métanotum est bien moins proéminent que chez la *P. emmæ*, mais il est de formation analogue et tout autre que chez la *P. mexicana*, où il est bas et peu convexe. Écaille très fortement inclinée. Pattes et antennes longues et grêles.

Très lisse et très luisante, comme à *P. mexicana*. Pilosité brune, épaisse, obtuse, répandue sur le corps, les tibias et les scapes, plus obtuse que chez la *P. mexicana*. Pubescence assez abondante sur les pattes et les scapes, très éparses ailleurs.

D'un brun sale, souvent légèrement jaunâtre. Abdomen brun foncé. Antennes, pattes, surtout les articulations et mandibules d'un brun jaunâtre ou d'un jaune brunâtre. Tarses d'un jaune testacé pâle.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*).

Cette espèce est très particulière. Elle est moins grêle que la *P. longicornis* et se rattache au groupe de la *P. emmæ* par la forme du thorax. Sa couleur, sa pilosité et son absence de sculpture lui donnent une ressemblance extérieure avec la *P. mexicana* qui se rattache du reste à un tout autre groupe. Est-ce peut-être la vraie *P. nodifera* de Mayr? Cette espèce est insuffisamment décrite et a déjà été faussement identifiée; je ne m'y risque plus.

LASIUS.

Lasius, Fabricius, Syst. Piez. p. 415 (1804); Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 181.

Subgen. *Acanthomyops*, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xii. p. 699 (1862).

Les *Lasius* sont paléarctiques et néarctiques; ils vivent en général dans la terre.

1. *Lasius niger*.

Formica nigra, Linn. Syst. Nat. ed. 10, p. 580 (1758)¹.

Formica (Lasius) nigra, Latr. Gen. Crust. et Ins. iv. p. 126 (1809)².

Lasius niger, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 187³.

Hab. EUROPE³; AFRIQUE SEPTENTRIONALE³; ASIE etc.³.

Var. *neoniger*.

Lasius niger, Linn., var. *neoniger*, Emery, Zool. Jahrb. vii. p. 639 (1893)⁴.

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Californie⁴.—MEXIQUE (*coll. Saussure*).

FORMICA.

Formica, Linnæus, Syst. Nat. ed. 1 (1735); Mayr, Die Europ. Formicid. p. 45 (1861); Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 192.

Hypochira, Buckley, Proc. Ent. Soc. Phil. vi. p. 169 (1866).

Les *Formica* sont paléarctiques et néarctiques et font leurs nids dans la terre ou avec des matériaux divers accumulés.