

Var. *costaricensis*, n. *

♂. La ♂ maxima est encore plus robuste et un peu plus grande que les plus grosses ♂ *abdominalis*. La suture pro-mésnotale est plus fortement imprimée. La tête et le thorax sont d'un brun rougeâtre (noirâtre devant, plus rougeâtre derrière), couleur qui fait un peu passage à la race *ustulatus*. La ♂ minima est de 6 millim. long., testacée, avec la tête à peine un peu brunie.

Hab. COSTA RICA, Golfe Dulce (*Pittier*).

Race *ustulatus*.

Camponotus atriceps (Smith), st. *ustulatus*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. (2) xx. p. 339 (♂) (1884) ⁹.

Hab. GUATÉMALA, Retalhuleu (*Stoll* ⁹); NICARAGUA, Chontales (*Janson*) [♂]; COSTA RICA, Tuis (*Pittier*).

[Var. *mediopallidus*, n.

♂. Diffère du type par son abdomen noir à segments bordés de jaunâtre, tandis que le thorax, l'écaille et les cuisses sont d'un jaune testacé pâle. La pilosité est aussi plus pâle, un peu moins épaisse, et le thorax surtout plus luisant et moins sculpté. Mérite peut-être de former une race.

♀. Couleur de l'ouvrière, mais le mésnotum et le scutellum ont trois bandes longitudinales noirâtres, dont la médiane est interrompue au milieu.

Hab. COLOMBIE, Dibulla, pied de la Sierra Nevada de Santa Marta (*Lallemand*).]

Var. *atricipito-esuriens*.

Camponotus atriceps (Smith), var. *atricipito-esuriens*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. (2) xvi. p. 77 (♂) (1879) ¹⁰.

Camponotus abdominalis (Fabr.), var. *atricipito-esuriens*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 220 ¹¹.

Hab. MEXIQUE ^{10 11}.

par sa stature au contraire un peu plus étroite et un peu plus grêle. Cependant la ♂ minima a la tête aussi large derrière que devant. Entièrement d'un jaune testacé vif et rougeâtre. Seuls les scapes, les mandibules et le bord antérieur des joues sont d'un brun foncé chez la ♂ major, d'un brun plus clair chez la ♂ minor. Les tarses sont d'un roux plus foncé que le reste. La forte pilosité hérissée est d'un roux jaunâtre vif, un peu moins longue et moins épaisse que chez le *C. abdominalis*, courte et éparse sur les scapes, abondante sur les tibias. Mandibules densément striées.

Hab. JAMAÏQUE, Jardin botanique de Kingston (*Forel*).

Cette espèce habitait le pied d'un arbre, dans le tronc duquel elle avait son nid, nid dont les ouvertures, situées dans des défants de l'écorce, étaient fermées par un carton ligneux grossier, analogue à celui du *Cremastogaster stollii*. Lorsque je démolis ce carton, les ♂ m'attaquèrent avec une fureur et une tenacité tout-à-fait inusitées dans le genre *Camponotus* et bien plus intense que celles des races du *C. abdominalis*. Le *C. conspicuus*, Smith, qui abonde à la Jamaïque et lui ressemble à première vue, est au contraire pacifique.

Je dédie cette espèce à mon ami M. Hannan, qui m'a si aimablement reçu à Kingston.

Race *willardi*, n. st.

♂. Long. 7.5-9.5 millim. Plusieurs ♂ (14) minor et media. Existe-t-il une ♂ major aussi grosse et une ♂ minor aussi petite que chez le *C. hannani*? Diffère de ce dernier par sa couleur entièrement d'un jaune ocreux clair, par sa pilosité plus pâle, courte et abondante sur les scapes, un peu oblique sur les tibias, plus abondante sous la tête, par sa tête plus courte et plus large, à bord postérieur presque droit (plus échancrée et à angles occipitaux plus arrondis chez le *C. hannani*, i. sp.). Sur chaque segment abdominal une bande étroite, nuageuse, indistincte, d'une couleur un peu plus foncée.

Hab. JAMAÏQUE (*Capper*).

Est-ce une autre espèce, moins polymorphe que le *C. hannani*?