

Race *esuriens*.

Formica esuriens, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 54 (♀) (1858)¹²; Norton, Amer. Nat. ii. p. 59 (1868)¹³.

Camponotus esuriens, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xiii. p. 398¹⁴; MacCook, Proc. Acad. Phil. 1879, p. 140¹⁵; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 229¹⁶.

Formica (Camponotus) esuriens, Norton, Proc. Essex Inst. vi., Comm. p. 1 (♀ ♂) (1868)¹⁷.

Camponotus atriceps (Smith), st. *esuriens*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. (2) xvi. p. 76 (♀) (1879)¹⁸; xx. p. 340 (♀) (1884)¹⁹.

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.—MEXIQUE^{12 13 16 17 19}, Iles des Tres Marias, Presidio de Mazatlan (*Forrer*), Cordova (*Sallé*), Atoyac en Vera Cruz (*Schumann*); GUATÉMALA (*Stoll*¹⁹), Sabo en Vera Paz (*Champion*); NICARAGUA, Chontales (*Janson*); PANAMA, Bugaba, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [♀ ♂ ♂], Colon (*Janson*).

Race *esuriens*, var. *fulvaceus*.

Formica fulvacea, Norton, Amer. Nat. ii. p. 60, t. 2. fig. 1 (♀) (1868)²⁰.

Formica (Camponotus) fulvacea, Norton, Proc. Essex Institute, vi., Comm. p. 2, fig. (♀)²¹.

Camponotus esuriens, var. *fulvaceus*, Mayr, Sitzungsab. Akad. Wiss. Wien, xli. p. 377²².

Hab. AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.—MEXIQUE²⁰⁻²².

Race *sharpi*.

Camponotus sharpi, Forel, Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 335²³.

Hab. MEXIQUE, Temax en Yucatan (*Gaumer*); GUATÉMALA, El Reposo (*Champion*) [♀ ♂].—ANTILLES, St. Vincent²³.

J'avais prévu (*loc. cit.*) que cette forme devrait se rattacher tôt ou tard comme race à l'un des groupes *C. abdominalis* ou *C. maculatus*. L'étude de ces fourmis que l'ai faite en Colombie me prouve qu'il se rattache sans aucun doute au *C. abdominalis*.

Race *stercorarius*.

Camponotus atriceps (Smith), st. *stercorarius*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. (2) xx. p. 340 (♀ ♂ ♂) (1884)²⁴.

Hab. MEXIQUE, Presidio de Mazatlan (*Forrer*), Chilpancingo, Teapa (*H. H. Smith*), Temax en Yucatan (*Gaumer*); GUATÉMALA, environs des Villes de Guatémala et d'Antigua, Sinanja, San Gerónimo (*Champion*; *Stoll*²⁴); NICARAGUA, Chontales (*Janson*); COSTA RICA (*Tonduz*), Buenos Aires (*Pittier*); PANAMA, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [♀ ♂ ♂].

Cette race fait sur le plateau guatémalien son nid fort régulièrement sous les bouses desséchées, d'après le Professeur Stoll.

[5. *Camponotus fragilis*.

Camponotus fragilis, Pergande, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) iv. p. 26 (♀) (1893)¹.

Hab. BASSE CALIFORNIE, San José del Cabo, San Fernando¹.]