

*Race guatemalensis.*

*Camponotus sylvaticus* (Oliv.), st. *guatemalensis*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. (2) xx. p. 346 (♂) (1884)<sup>15</sup>.

*Camponotus maculatus* (Fabr.), st. *guatemalensis*, Emery, in litt.<sup>16</sup>

*Camponotus guatemalensis*, Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 233<sup>17</sup>.

*Hab.* GUATÉMALA<sup>17</sup>, Tecpam 7000' (*Stoll*<sup>15</sup>), Ostuncalco 7500' (*Champion*).

*Race impatibilis*, n. st.

♂. Long. 8 à 11.5 millim. Extrêmement semblable à la race *simillimus*, Smith, mais plus grêle. La pubescence, longue et assez abondante chez le *C. simillimus*, est extrêmement courte et diluée. En outre les mandibules sont subopaques, densément réticulées vers la base et striées vers l'extrémité (luisantes et assez lisses chez le *C. simillimus*). La couleur est aussi plus brune (moins rougeâtre), plus noirâtre chez la ♀ major, plus claire chez la ♀ minor, dont la tête est un peu plus allongée. Les tibias ont une rangée de petits piquants encore un peu plus distincts et le lobe de l'épistome est un peu plus fort. Pattes et antennes plus longues.

*Hab.* COSTA RICA (*Tonduz*).

Cette forme ressemble beaucoup au *C. landolti*, mais elle est plus robuste, faisant du reste une certaine transition entre le *C. simillimus* et ce groupe plus grêle rapporté anciennement par moi au *C. extensus*.

*Race toltecus*, n. st.

♂. Long. 7.4 à 8.5 millim.

♂ *major*. Mandibules luisantes, ponctuées, avec quelques stries vers l'extrémité, armées de 7 dents. Épistome caréné, à lobe rectangulaire bien net. Tête très rétrécie devant, bien plus que chez le *C. bonariensis*, Mayr, auquel il ressemble, à côtés assez convexes, fort élargie et échancrée derrière. Face basale du métanotum longue et lentement abaissée vers la déclive qui est courte et très indistincte. Écaille grande, assez épaisse, fortement convexe devant, plane derrière, à bord tranchant, tout-à-fait postérieur. Tibias sans aucun petit piquant.

Dessus de la tête assez densément réticulé et subopaque. Tout le reste luisant et faiblement chagriné. Pilosité longue, roussâtre, pointue, espacée sur tout le corps, courte sur les joues, très éparsée sur les scapes, nulle sur les tibias. Pubescence extrêmement éparsée et courte. D'un jaune sale, un peu brunâtre sur le dos. Milieu des segments abdominaux (presque tout l'abdomen), dessus de la tête, scapes et mandibules brunâtres.

♂ *minor*. Tête allongée, rétrécie derrière les yeux, sans cou. Entièrement d'un jaune terne et pâle, avec la tête et l'abdomen d'un jaune un peu plus foncé.

♀. Long. 10.5 millim. Ailes enfumées de roussâtre, avec la tache et les nervures d'un brun pâle. Hanches et cuisses d'un jaunâtre assez pâle. Face basale du métanotum haute et assez courte. Du reste tout-à-fait comme la ♀ major.

*Hab.* MEXIQUE, Michoacan.

Reçue par M. le Prof. Emery.

**9. *Camponotus landolti*.**

*Camponotus sexguttatus*, var. *landolti*, Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. (2) xvi. p. 71 (♂) (1879)<sup>1</sup>.

*Camponotus landolti*, Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. xxx. p. 168 (1886)<sup>2</sup>; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 237<sup>3</sup>.