

Hab. MEXIQUE, Chilpancingo (*H. H. Smith*); PANAMA, Caldera en Chiriqui (*Champion*) [♂].—COLOMBIE ^{1 2 3}.

Cette forme doit prendre le rang d'espèce, depuis que le nom de *C. sexguttatus* a été enlevé au *C. substitutus* pour être rendu à la forme *C. ruficeps*, Smith = *C. sexguttatus*, Fabr. Je ne puis la laisser avec le *C. extensus*, Mayr, d'Australie, car il s'agit évidemment d'un groupe néotropical dérivé des races néotropiques du *C. maculatus*. Les formes *C. substitutus*, *C. melanoticus*, *C. zonatus* doivent être considérées soit comme races du *C. landolti*, soit comme une autre espèce.

Le *Camponotus landolti* est extrêmement répandu dans la forêt du pied de la Sierra Nevada de Santa Marta. Il vit au plus profond de la forêt, même là où jamais le soleil ne pénètre, faisant son nid dans les troncs pourris. Il est timide; on le voit se promener sur les troncs, au bord des ruisseaux etc.

Race *substitutus*.

Camponotus melanoticus, var. *substitutus*, Emery, Boll. Mus. Zool. ed Anat. comp. R. Univ. Torino, ix. no. 187, p. 3 ⁴.

Camponotus sexguttatus, auct. (nec *fabricii*), Forel, Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. (2) xx. p. 346 ⁵.

Hab. GUATÉMALA, Retalhuleu et la Ville de Guatémala (*Stoll* ⁵); COSTA RICA, Buenos Ayres (*Pittier*); PANAMA, Bugaba (*Champion*) [♀ ♂].—AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Colombie (*Forel*), Brésil ⁴, Bolivie ⁴, Paraguay ⁴.

Vit dans la terre, dans le sable des lieux plutôt découverts, où il fait son nid. Timide.

Race *zonatus*.

Camponotus extensus (Mayr), subsp. *zonatus*, Emery, Boll. Mus. zool. ed Anat. comp. R. Univ. Torino, ix. no. 187, p. 3 (♀ ♂) (1894) ⁶.

Hab. COSTA RICA ⁶, dans la "tierra caliente" (*Pittier*) [♀ ♂].

Race *albicoxis*, n. st.

♂ *minor*. Long. 6.7 millim. Le rétrécissement de la tête, derrière les yeux est plus fort et rectiligne (non convexe) vu de devant, ce qui correspond à une dépression postérieure des côtés de la tête. Yeux très gros et convexes. Écaille, vue de côté, simplement conique, moins épaisse que chez le *C. landolti*, et surtout avec une seule surface antérieure (sans surface supérieure inclinée en avant). Pas trace de petits piquants aux tibias.

Pilosité plus abondante sur le corps et plus jaunâtre que chez le *C. landolti*, i. sp. Sculpture et pubescence identiques. Funicules, pattes et mandibules bruns. Hanches (sauf la base), bord supérieur des anneaux fémoraux et des cuisses, ainsi qu'une tache déchiquetée sur chaque côté de chaque segment abdominal d'un blanc à peine jaunâtre. Le reste du corps d'un brun noirâtre. Du reste comme le *C. landolti*, i. sp.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*).

Il s'agit probablement d'une espèce nouvelle, mais la ♂ *minor* étant seule connue, je la rattache provisoirement au *C. landolti*. Ressemble en petit aussi au *C. lespesi*, mais les pattes, les antennes et le cou sont bien moins grêles.