

10. *Camponotus lespesi*.

Camponotus lespesi, Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. xxx. p. 169 (1886)¹; Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. p. 513 (♀ ♂)²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 238³.

Hab. PANAMA, Bugaba, Volcan de Chiriqui (*Champion*) [♀ ♂].—COLOMBIE (*Landolt*); BRÉSIL^{1 2 3}.

11. *Camponotus obreptivus*, sp. n.

♂. Long. 10.5 à 12.5 millim. Très voisin du *C. lespesi*, peut-être une simple race. Il en diffère par son écaille comprimée, haute, assez tranchante au sommet, également épaissie devant et derrière vers la base, formant de profil un cône élevé et étroit, tandis que, vue de devant ou de derrière, elle est squamiforme. L'insecte est un peu moins grêle, les pattes et les antennes sont un peu moins longues. La tête de la ♀ minor est un peu moins rétrécie derrière où ses côtés sont distinctement convexes dès l'articulation avec le pronotum. Le thorax est un peu plus large et surtout plus haut et plus convexe d'avant en arrière. L'épistome est plus convexe, plus fortement caréné, formant devant un lobe plus arrondi chez la ♀ minor, plus trapeziforme chez la ♀ major (sans l'angle latéral proéminent, subdentiforme qu'y a le *C. lespesi*). Le devant de la tête et les mandibules sont moins mats, ces dernières assez luisantes et plus courbées, surtout chez la ♀ major. La pilosité est plus abondante et d'un roux brunâtre, abondante derrière la tête. Pubescence soulevée sur les scapes et les tibias. Du reste comme le *C. lespesi*.

♀ minor. D'un testacé roussâtre, ferrugineux et mat, avec la base des jambes plus pâle et le vertex un peu bruni.

♀ major. Tête un peu plus large, surtout derrière, que chez le *C. lespesi*. D'un ferrugineux brun-roussâtre, avec l'abdomen et le devant de la tête d'un brun plutôt clair et le bord des segments abdominaux jaunâtre.

Hab. COSTA RICA (*Tonduz*).

12. *Camponotus agra*. (Tab. IV. figg. 19, 19 a, ♀.)

Formica agra, Smith, Cat. Hymen. vi. p. 47 (♀) (1858)¹.

Camponotus agra, Mayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. p. 356 (1886)²; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 221³.

Hab. PANAMA, Bugaba et Caldera en Chiriqui (*Champion*) [♀].—COLOMBIE¹⁻³; BRÉSIL, Petropolis¹.

13. *Camponotus tenuiscapus*.

Camponotus tenuiscapus, Roger, Berl. ent. Zeitschr. vii. p. 143 (♀) (1863)¹; Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xix. p. 365 (1887)².

Hab. AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Monte Video^{1 2}.

Race *punctulatus*.

Camponotus punctulatus, Mayr, Ann. Soc. Nat. Modena, iii. p. 161 (♀) (1868)³; Dalla Torre, Cat. Hymen. vii. p. 248⁴.

Camponotus tenuiscapus, st. *punctulatus*, Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. xix. p. 365 (♀) (1887)⁵.

Hab. AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, Brésil⁴, Argentine⁴.