

Eubagis postverta (I. p. 250).

To the localities given, add:—MEXICO, Tampico (*Richardson*), Cuesta de Misantla (*Trujillo*), La Venta, Rio Papagaio, Atoyac, Teapa (*H. H. Smith*); GUATEMALA, Volcan de Santa Maria (*Richardson*).

Eubagis dyonis (I. p. 250).

To the localities given, add:—MEXICO, Acaguizotla, Venta de Zopilote, Atoyac (*H. H. Smith*), Coatepec (*Brooks*); GUATEMALA, Volcan de Santa Maria (*Richardson*); HONDURAS, San Pedro Sula (*Wittkugel*), Ruatan I. (*Gaumer*); NICARAGUA, Matagalpa (*Richardson*).

Eubagis glauce (I. p. 251).

To the localities given, add:—MEXICO, Atoyac (*H. H. Smith*), Coatepec (*Brooks*); GUATEMALA, Senahu, Sabo, San Gerónimo (*Champion*).

HÆMATERA (I. p. 251).

Hæmatera pyramus (I. p. 252).

To the localities given, add:—COSTA RICA, Santa Clara Valley (*Zurcher*).

CYCLOGRAMMA (I. p. 252).

Cyclogramma pandama (I. p. 253).

To the localities given, add:—MEXICO, Omilteme (*H. H. Smith*), Jalapa, Orizaba (*F. D. G.*); GUATEMALA, Volcan de Santa Maria (*Richardson*).

Cyclogramma bacchis (I. p. 253).

Cyclogramma bimaculata, Staud. Exot. Schmett. p. 97, t. 40³.

To the localities given, add:—MEXICO, Tepetlapa in Guerrero (*H. H. Smith*).

CALLICORE (I. p. 254).

Callicore astala (I. p. 254).

To the localities given, add:—MEXICO, Jalapa (*F. D. G.*), Orizaba (*Elwes*), Atoyac (*H. H. Smith*); GUATEMALA, Volcan de Santa Maria (*Richardson*); HONDURAS, San Pedro Sula (*Wittkugel*); NICARAGUA, Matagalpa (*Richardson*).

1 (A). **Callicore asteria**. (Tab. CVIII. figg. 31, 32, ♂.)

Callicore asteria, Godm. & Salv. Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) xiv. p. 97¹.

C. astalæ similis, sed anticis macula nitente cærulea mediana absente: subtus anticis nigris, ad basin fascia angusta sinuata mediana et ad apicem (linea submarginali excepta) albis, ad cellulæ finem plaga coccinea notata; posticis sicut in *C. astala*, sed apicem versus fusco-brunneo suffusis.

♀ nobis ignota.