

- gg.* Alæ hyalinæ, campo appendiculari longiore quam latiore; elytra apice rotundato.—12. *albomarginata*, sp. n.
- ff.* Minimæ; alis hyalinis, campo appendiculari longissimo. Elytra margine costali testaceo.
- g.* Alarum campus appendicularis reliquæ alæ sensim brevior.—[10. *replicata*, sp. n.]
- gg.* Alarum campus appendicularis reliquæ alæ sensim æquilongus.—[11. *grandipennis*, sp. n.]
- cc.* Pronotum totum fusco-opacum. Elytra angusta, subacuminata, venis campi discoidalis longitudinalibus crassiusculis, 4-5.
- d.* Media; alæ nebulosæ, campo appendiculari minore, vix 3<sup>am</sup> partem longitudinis alæ æquali.—[7. *otomia*, Sss.]
- dd.* Maxima; alæ flavicantes, campo appendiculari magno.—[6. *major*, sp. n.]
- bb.* Elytra venis longitudinalibus tantum 2, illis campi discoidalis gracilibus; vena media vel ulnaris oblique ramosa.
- c.* Elongato-elliptica; elytris basi testaceo-marginatis. Alæ nigræ. Lamina supra-analis trigonalis, incisa.—18. *dohrniana*, sp. n.
- cc.* Crassa, convexa; elytris totis castaneis; alis subhyalinis.—20. *jansoni*, sp. n.

## II.

## 1. Elytra:

- a.* Venulæ costales campi marginalis regulares, rectæ, obliquæ, breves.
- b.* Elytra angusta, venis longitudinalibus crassiusculis; vena discoidali recta, venulas valde obliquas apice subincrassatas, ad costam emittente. Campus discoidalis venis longitudinalibus 3-5 ad apicem perductis (scilicet ramis 2-4 venæ mediæ et vena ulnari). (Tab. IV. fig. 1.)
- c.* Venæ disci omnes longitudinales.
- d.* Vena mediastina brevis, marginem costalem medium haud attingens.
- e.* Elytra angusta, abdomen valde superantia. Insecta in requiete postice attenuata.
- f.* Grandis; campus discoidalis elytri venis longitudinalibus 5.—[6. *major*.]
- ff.* Mediocris; campus discoidalis elytri venis longitudinalibus 4 (vel 3).
- g.* Venulæ costales circ. 12-14; primæ valde, ultimæ minus obliquæ. (Tab. IV. fig. 1.)—1. *mexicana*; [2. *peruviana*]; 4. *tolteca*; [5. *moxa*.]
- gg.* Venulæ costales omnes parallelæ.—3. *nahua*.
- ee.* Elytra abdomen minus vel parum superantia. Insecta in requiete anguste elliptica.
- f.* Alæ normales, abdomine et elytris valde longiores.—7. *otomia*; 8. *azteca*; 9. *fallax*; [10. *replicata*]; [11. *grandipennis*]; 12. *albomarginata*; 14. *domestica*.
- ff.* Alæ minutæ, abdomine et elytris vix longiores.—13. *parvipennis*.
- dd.* Vena mediastina elongata, venulis costalibus minus numerosis (5-9). Elytra apice ad marginem suturalem acuminata, margine suturali recto, costali apice