

arcuato; campo discoidali venis longitudinalibus tantum 3 (vena media tantum furcata). (Tab. IV. fig. 11.)

e. Apex elytri acutus; campus discoidalis inter venas venis spuriis nullis.

f. Vena mediastina medium marginem vix attingens. Venulæ costales proximæ, regulares, circ. 7, ultimæ irregulares. Areæ inter illas venis spuriis reticulatæ.—[15. *alaris*.]

ff. Vena mediastina medium marginem attingens vel superans. Venulæ costales tantum 5–6, remotæ, 1^a longissima, ultimæ subtiles, areis inter illas latis, reticulatis.—17. *elliptica*.

ee. Apex elytri hebetatus; campus discoidalis venis spuriis inter venas instructus, reticulosus. Venulæ costales regulares. (Tab. IV. fig. 11.)—16. *decipiens*.

cc. Vena media basi furcata, ejus rami ramulos obliquos ad marginem suturalem emittentes.—18. *dohrniana*.

bb. Elytra brevia, lata, venis longitudinalibus tantum 2 parallelis (discoidali et media); campus marginalis latior, $\frac{2}{5}$ latitudinem elytri efficiens. Venæ costales regulares, graciles, omnes parallelæ; vena media irregularis, ramos obliquos 3–4 ad secundam partem marginis suturalis emittens. Venæ omnes graciles, excepto venæ mediastina et analis. (Tab. IV. fig. 16.)—19. *fulgida*; 20. *jansoni*.

aa. Campus marginalis latissimus, dimidiam latitudinem elytri efficiens; vena discoidalis basi fortiter retro-arcuata, dehinc longitudinalis, undulata. Venulæ costales primæ 5 vel 6 longæ, arcuatæ, invicem proximæ, flabellatæ; reliquæ rectæ, obliquæ (nonnunquam furcatæ). Vena media a basi in ramos longitudinales undulatos soluta (4–5), in margine desinentes. Venæ omnes graciles. (Tab. IV. fig. 13.)—21. *flabellata*.

2. Alarum campus appendicularis :

a. major, margine basali transverso (Tab. IV. figg. 5, 8, &c.):

b. longior quam latior.—[6. *major*]; [10. *replicata*]; [11. *grandipennis*]; [15. *alaris*]; 17. *elliptica*.

bb. brevior quam latior.—8. *azteca*; (14. *domestica*); (16. *decipiens*, ♂); 19. *fulgida*; 21. *flabellata*.

aa. minor, margine basali obtusangulo (Tab. IV. figg. 7, 9 &c.):

b. parum angulato.—1. *mexicana*; [2. *peruviana*]; 4. *tolteca*; [5. *moxa*]; 7. *otomia*; (8. *azteca*); 9. *fallax*; 12. *albomarginata*; 13. *parvipennis*; 14. *domestica*; 16. *decipiens*, ♀; 18. *dohrniana*; 19. *fulgida*; 20. *jansoni*; 21. *flabellata*, var.

bb. valde angulata.—3. *nahua*.

3. Alarum venulatio :

a. Campus marginalis apice haud dilatatus. Area medio-discoidalis per venulas transversas divisa. (Tab. IV. fig. 2.)

b. Campus marginalis apice attenuatus; vena discoidali apice antrorsum deflexa.

c. Campus marginalis plerumque angustus. Area medio-discoidalis in parte apicali per venam longitudinalem divisa. (Tab. IV. figg. 2, 7, 10.)

d. Ultima venula transversa (Tab. IV. fig. 2, o) angulata, venam longitudinalem ab angulo emittens.

e. Vena longitudinalis elongata, 3^{am} partem areæ æquans.—1. *mexicana*; [2. *peruviana*]; 4. *tolteca*; 8. *azteca*.