

- ee.* Vena longitudinalis brevior, 4^{am} partem areæ æquans.—3. *nahua*; 7. *otomia*; 9. *fallax*; 12. *albomarginata* (brevis); 16. *decipiens*.
- dd.* Ultima venula transversa (Tab. IV. fig. 4, *o*) obliqua, venam longitudinalem (longiusculam) ab ejus apicem posticam emittens; hæc itaque frequentius obliqua.—[5. *moxa*]; 12. *albomarginata*.
- cc.* Campus marginalis latus.—14. *domestica*.
- bb.* Campus marginalis apice haud sensim attenuatus; vena discoidali tota recta; area medio-discoidalis tota per venulas transversas divisa. (Tab. IV. fig. 6.) Areæ ulnares binæ plerumque latiusculæ, distinctissimæ.—[6. *major*]; 18. *dohrniana*; 19. *fulgida*; 20. *jansoni*; 21. *flabellata*.
- aa.* Campus marginalis a medio ad apicem dilatatus, vena discoidali recta (cum vena spuria humerali haud confundenda). Area medio-discoidalis lata, per venulas transversas paucas vel tantum una, divisa. (Tab. IV. figg. 5, 12.)
- b.* Ultima venula transversa (*o*) areæ medio-discoidalis venam unicam longitudinalem longiusculam emittens. Ultima venula transversa:
- c.* angulata. (Tab. IV. fig. 12.)—[10. *replicata*]; 13. *parvipennis*.
- cc.* recta, obliqua, venulam longitudinalem ab ejus apice postico emittens. (Tab. IV. fig. 5.)—[11. *grandipennis*.]
- bb.* Ultima venula transversa areæ medio-discoidalis subapicalis, arcuata, cum vena discoidali in arcum continua, venulas 2–3 brevissimas longitudinales vel obliquas emittens. (Tab. IV. fig. 8.)—[15. *alaris*]; 17. *elliptica*.
4. Lamina supra-analis, ♀:
- a.* Paulum producta:
- b.* trigonalis:
- c.* transverso-trigonalis,
- d.* apice leviter truncata.—[5. *moxa*.]
- dd.* integra.—19. *fulgida*; 21. *flabellata*.
- cc.* trigonalis, fissa, vel incisa, apice bilobata.—18. *dohrniana*.
- bb.* rotundata:
- c.* subparabolica.—7. *otomia*; 21. *flabellata*.
- cc.* obtuse rotundata.—1. *mexicana*; [2. *peruviana*]; [15. *alaris*].
- aa.* Transversa, margine postico transverse arcuato.—4. *tolteca*; 8. *azteca*; 9. *fallax*; [10. *replicata*]; [11. *grandipennis*]; 12. *albomarginata*; 13. *parvipennis*; 14. *domestica*; 17. *elliptica*.

Sectio I.

Elytra venis costalibus rectis, brevibus; venis campi discoidalis longitudinalibus, regularibus, rare ramosis.

1. *Anaplecta mexicana*, Sauss. (Tab. IV. figg. 1, 2.)

Anaplecta mexicana, Sauss. Miss. Scient. Mex., Orthopt. p. 15. 2, t. 1. figg. 9, 9*a*, 9*e* (♂ ♀) (1870).

Testacea; abdomine, pronoti disco vittaque obliqua elytrorum ad venam analem fuscis; vertice et maculis 2 pronoti flavidis. Pronotum minutum, perfecte ellipticum, ejus maxima latitudo in media longitudine occurrens. Elytra angusta, elongata, apice acuminato-rotundata; vena media a basi in ramos 3 divisa. Alæ infuscatæ, campo intermedio apice flavo, campo marginali obscuro, margine frequenter flavo; venis