

Synopsis specierum.

Femora anteriora subtus in margine interno (anteriore) parte proximali spinis 3-6 armata, parte distali spinulis minimis piliformibus numerosis instructa, necnon ante spinas apicales 2 spina majore prædita. (Species Americanæ.)—PLATAMODES*, Scudd.

A. Uterque sexus cognitus, saltem feminae.

a. Elytra in feminis abbreviata, in maribus completa.

b. Majuscula, fusca, pronotum utrinque luteo-marginatum.—1. *inæqualis*, sp. n.

bb. Minor, fulvo-testacea.—[2. *uhleriana*, Sss.]

aa. Elytra in utroque sexu abdomen superantia.

b. Antennæ unicolores.

c. Majores.

d. Fusca, alis infuscatis, pronoto utrinque luteo-pellucido limbato.—3. *mexicana*, Sss.

dd. Pronoto toto corneo, haud pellucido limbato. Color fuscus vel fulvescens.

e. Lamina supra-analis haud truncata.

f. Lamina supra-analis in medio producta.—4. *consobrina*, Sss.

ff. Fulva; lamina supra-analis ♀ tota latitudine rotundata.—5. *conformis*, sp. n.

ee. Lamina supra-analis truncata.—6. *ignobilis*, Sss.

cc. Minores.

d. Media, crassiuscula; pronotum ellipticum, margine postico arcuato, disco ♀ sulcis nullis, ♂ obsoletis. Color pallide testaceus.—7. *nahua*, Sss.

dd. Minutæ, graciliores, castaneæ; pronotum postice parum arcuatum, impressionibus 2 distinctis. Alæ frequenter infuscatae.

e. Pronotum totum castaneum.

f. Lamina supra-analis producta, truncata.—8. *inca*, sp. n.

ff. Lamina supra-analis trigonalis.—9. *castanea*, Sss.

ee. Pronotum utrinque marginibus pallidis:

f. vittis marginalibus arcuatis flavis.

g. Media. Pronotum disco fusco, circumcirca luteo-marginato.—10. *azteca*, Sss.

gg. Minor. Pronotum utrinque flavo-limbato, vitta flava anterieus completa vel interrupta.—11. *tolteca*, Sss.

ff. marginibus luteis antice et lateraliter ubique æquilatis.

g. Testaceo-pellucidis (lamina supra-anali ♂ minus producta, late trigonali).—12. *nana*, sp. n.

gg. Testaceo-opacis (lamina supra-anali ♂ angusta, longe producta, apice fere semicirculariter excisa).—13. *parvula*, Sss.

bb. Antennæ annulo albido.—14. *annulicornis*, sp. n.

AA. Feminae ignotæ.

a. Major, brunnea vel rufescens. Pronotum valde ellipticum, disco fusco, circumcirca luteo-limbato (*inæquali* affinissima).—15. *couloniana*, Sss.

aa. Minores.

* Stål has extended this subgenus to include several other genera (comp. p. 30); the name is twice preoccupied in Insecta.