

1. **Anisopygia jocosicluna**, Sauss. (*A. jocosiclunis*, Tab. I. figg. 25, 26.)

*Anisopygia jocosicluna*, Saussure, Societas Entomologica, 1893, p. 57.

♂. Fusco-castanea. Antennæ basi rufescentes; os et ocelli fulvi. Pronotum impressionibus vix ullis, sparse punctatum, margine anteriore et lateralibus flavo-fulvis; margine posteriore vix angulato. Elytra abdominis segmenta 3-4 tegentia, apice rotundata, venis distinctis; area costali fulvo-flava, margine suturali sese leviter tegentia. Alæ minutæ, rotundatæ, venis et margine anteriore fusco-rufis, vena mediastina ramulis incompletis 3. Pedes fusco-rufescentes vel fusco-testacei. Femora anteriora margine interno basi spinis 3-4, apice spinulis minimis numerosis piliformibus armato. Abdomen fusco-nigrum. Segmentum 5<sup>m</sup> in medio sinuatum et subelevatum, 6<sup>m</sup> tota latitudine angulatim excisum et in medio incisum; 7<sup>m</sup> tota latitudine arcuatim sinuatum ac in medio carinulatum. Lamina supra-analis valde deformis; ejus incisura lata, basi rotundata; ejus lobi æquilongi, lobo dextro late rotundato, apice rufescente, lobo sinistro intus rotundato-marginato, trigonali, apice anguste producto, rotundato-hebetato. Cerci mediocres, subacuminati. Lamina infra-genitalis convexa, apice compressa, irregulariter rotundata, laminam supra-analem superans, stylis 2 valde inæqualibus in medio margine instructa; his invicem propinquis, dextro longiore, crasso, obtuso, sinistro frequenter abortivo. Margo posterior laminæ infra-genitalis anguste flavus, irregularis, inter stylos leviter sinuatus, juxta stylum dextrum in processum minutum trigonale productus.

Long. 9.5; elytr. 4.5, pronot. 2.75, latit. pronot. 4 millim.

*Hab.* GUATEMALA, Capetillo (*Champion et coll. Dohrn*).

TEMNOPTERYX, Brunn.

*Temnopteryx*, Brunner de W. Syst. Blatt. p. 83.

*Platamodes*, Stål (ex parte).

Pronotum corneum, parabolicum, convexum, impressionibus discoidalibus nullis vel obsoletis. Elytra truncata (vel ♂ tantum abbreviata), cornea, articulata, sese sæpius intus leviter tegentia, sulco anali perspicuo vel oblitterato. Alæ minimæ. Lamina supra-analis ♀ trigonalis, apice subrotundata vel leviter incisa.

*Synopsis specierum.*

I.

1. Femora anteriora ad typum 1<sup>m</sup> pertinentia. (Comp. p. 30.) [*Platamodes*, Stål, ex parte.]
  - a. Pronotum et elytra unicolora, testacea vel rufescentia. Elytra ♀ primum abdominis segmentum tegentia, apice *extus* rotundata.
    - b. Abdomen totum nigrum. Pronotum et elytra rufescentia.—[1. *texensis*, sp. n.]
    - bb. Abdomen luteo-marginatum. Pronotum et elytra testacea.
      - c. Pronotum totum testaceum.—2. *tarasca*, Sss.
      - cc. Pronotum brunneo-lineolatum. Elytra ♂ abdominis segmenta 6 tegentia, haud truncata, apice attenuata, rotundata.—3. *kaupiana*, Sss.
  - aa. Pronotum bicolor.
    - b. Pronotum et elytra testacea. Elytra 1<sup>m</sup> abdominis segmentum tegentia, angulo externo-apicali rotundato.
      - c. Pronotum pallide testaceum, nigro-bivittatum.—4. *otomia*, Sss.
    - cc. Pronotum rufescens, disco fusco-vario:
      - d. utrinque fusco-umbrato.—[1. *texensis*, var.]
      - dd. fusco-punctato.—5. *nitida*, sp. n.