

- bb.* Nigro-castaneæ vel rufescentes. Pronotum et elytra lateraliter flavo-limbata. Pedes rufescentes.
- c.* Elytra oblique truncata, apice ad costam angulata, sulco anali nullo. Lamina supra-analis ♀ trigonalis vel apice truncata.
- d.* Elytra valde oblique truncata, acutangula, margine suturali quam margo costalis duplo brevior, margine apicali subsinuato, apice anguste rotundato. Pronotum et elytra anguste flavo-limbata.—6. *limbata*, Sss.
- dd.* Elytra transverse, parum oblique truncata, margine suturali quam margo costalis haud duplo brevior, angulis hebetatis. Pronotum et elytra latiuscule flavo-limbata.—7. *sumichrasti*, Sss.
- cc.* Elytra apice rotundata.
- d.* Elytra coriacea, apice haud attenuata, late rotundata, margine costali recto, venis perspicuis, sulco anali distincto.—8. *guatemalæ*, sp. n.
- dd.* Elytra cornea, attenuata, anguste rotundata, margine costali arcuato, sulco anali perspicuo.—9. *fissa*, sp. n.
- bbb.* Ferruginescens. Lamina supra-analis trigonalis.—[10. *major*, sp. n.]
11. Femora anteriora ad typum 2^m pertinentia.
- * Pronotum corneum, impressionibus nullis, plus minus parabolicum. Elytra in utroque sexu truncata, vel in ♂ abbreviata, intus sese leviter tegentia. Femora anteriora in margine anteriore toto, saltem in dimidia parte apicali spinis subæqualibus invicem remotis armata.—[11. *brevipennis*, Sss.]

II.

- a.* Elytra in utroque sexu distincte truncata (*cfr.* Tab. III. fig. 31):
- b.* oblique truncata, angulo apicali costali acutior:
- c.* breviter obliquissime truncata.—6. *limbata*.
- cc.* minus breviter, parum oblique truncata;
- d.* angulo apicali subacuto.—7. *sumichrasti*.
- dd.* angulo apicali rotundato.—[1. *texensis*.]
- bb.* transverse truncata:
- c.* angulo apicali costali rotundato.—4. *otomia*; [11. *brevipennis*].
- cc.* angulis binis apicalibus rotundatis.—8. *guatemalæ*.
- aa.* Elytra apice, saltem angulo costali, rotundata (*cfr.* Tab. IV. figg. 24, 29):
- b.* truncata, apice toto rotundato, arcuato,
- c.* parum fortiter arcuato.—8. *guatemalæ*.
- cc.* semiorbiculariter arcuato.—[10. *major*.]
- bb.* abbreviata, margine suturali recto, margine costali et apicali ad unum arcuato, angulo apicali-suturali solum acuto, angulo apicali costali nullo; in maribus longiora apice attenuato. (Species testaceæ, ad genus *Ceratinopteram* vergentes.)
- c.* Elytra ♀ margine apicali obliquo.—2. *tarasca*; 3. *kaupiana* ♀.
- cc.* Elytra attenuata, apice anguste rotundata, margine apicali nullo.
- d.* Castanea, elytris brevibus.—9. *fissa*.
- dd.* Pronoto et elytris testaceis; elytris longioribus.—3. *kaupiana* ♂; 5. *nitida* ♂ ♀.