

supra-analis ♀ longiusecula, rotundato-emarginata, rotundato-bilobata; ♂ brevior trapezina, obtusissime subincisa, angulis rotundatis.

♀. Long. 21.5, ♂ 18.25 millim.

*Hab.* MEXICO, Eastern Cordillera, Orizaba, and Moyoapan (*Sumichrast*), Puebla (*Saussure*), valley of the city of Mexico (*Forrer*).

## 2. *Eurycotis vittifrons*, sp. n.

♀. Nigra, *E. mexicanæ* formis simillima. Caput pallide testaceum, macula grandi faciei verticeque inter oculos, nigris, necnon vitta frontis supra antennis arcuata flavida. Antennæ rufo-fuscae, basi ultra 3<sup>m</sup> articulum fusca. Elytra rotundato-squamiformia, quam in specie laudata latiora, apice latius rotundata. Pedes testacei vel rufescentes. Lamina supra-analis sat elongata, obtusangulatim incisa, angulis rotundatis. Cerci laminam supra-analem parum superantes, apice subito anguste attenuati ac rufi.

Long. 8.5; elytr. 2.25, pronot. 5.75, latit. pronot. 7.5 millim.

*Hab.* GUATEMALA (*Oltramare*, *Mus. Genavense*).

## 3. *Eurycotis mysteca*, Sauss.

*Periplaneta mysteca*, Sauss. Rev. et Mag. de Zool. 1862, p. 170; Mém. Mex., Blatt. p. 77. 21.

*Polyzosteria mysteca*, Sauss. Miss. Scient. Mex., Orthopt. p. 71. 2, t. 2. fig. 40.

*Platyzosteria rufo-vittata*, Brunn. de W. Syst. Blatt. p. 215. 15.

♀. Nigra, convexiuscula; antennis ferruginescentibus, basi nigris. Maculae ocellares minutæ. Pronotum utrinque vitta submarginali aurantiaca vel rufa postice dilatata, rotundata, marginem posticum liberante. Elytra squamiformia, mesonotum leviter superantia, apice rotundata. Alæ nullæ. Spinæ tibiæ rufescentes. Lamina supra-analis ♀ illi *E. mexicanæ* conformis.

Long. 20.5 millim.

*Hab.* MEXICO, Oaxaca (*Saussure*).

## [4. *Eurycotis flavipennis*, sp. n.

♀. Nigra, nitida, *E. mexicanæ* formis simillima at paulo major. Antennæ ferrugineæ, basi testaceæ. Caput nigrum, ocellis et ore testaceis. Elytra anguste squamiformia ut in specie laudata, ochracea, marginibus omnibus anguste nigris. Pedes compressi, latiusculi, castanei, coxis testaceis, fusco-umbratis. Femora rufescentia, apice et marginibus subtus fuscis; posteriora subdilatata, apice leviter attenuata, faciebus binis planatis, subexcavatis punctatisque. Lamina supra-analis apice obtusangulatim incisa. Cerci nigri, parum acuti, regulariter acuminati ut in *E. mysteca*.

Long. 20.5; elytr. 3, pronot. 6, latit. pronot. 8 millim.

*Hab.* CUBA (*Poey*, *Mus. Genavense*).]

## 5. *Eurycotis quadri-squamata*, sp. n. (Tab. IV. fig. 40.)

♀. Fusco-castanea (vel nigra), nitida, coriacea. Antennæ ferruginescentes, basi castaneæ. Caput remote punctatum, maculis ocellaribus 2 flavis, vertice prominulo. Pronotum parabolicum, sat convexum, antice truncatum, postice transversum in medio brevissime subproductum. Elytra et alæ squamiformia, mesonotum et metanotum quarta vel quinta parte superantia, margine externo subrecto, interno arcuato. Elytra punctata, apice ad marginem acuminata; alæ apice potius truncatæ vel intus rotundatæ. Lamina supra-analis, fere ut in *E. mexicana*, quam longa basi duplo latior, margine postico obtusangulatim inciso, angulis haud acutis. Cerci?

Long. 19.25; pronot. 6.25, latit. pronot. 9, latit. abdom. 10.5 millim.

*Hab.* GUATEMALA, San Gerónimo (*Champion*: 1 ♀).