

[6. **Eurycotis opaca**, Brunn.*Platyzosteria opaca*, Brunn. de W. Syst. Blatt. i. p. 216. 17 (♂).

♂. Major, nigra, sparse punctata; elytra quadrata, truncata, transversa, mesonotum parum superantia. Coxæ testaceo-limbatae.

Long. 37 millim.

*Hab.* ANTILLES, Cuba.]7. [**Eurycotis finschiana**, Sauss.*Platyzosteria finschiana*, Sauss. Mélang. Orthopt. ii. iv<sup>e</sup> fasc. p. 111. 7 (1872) (♀ ♂).*Polyzosteria cabreræ*, Bolivar, An. Soc. Esp. Hist. Nat. x. p. 355, t. 8. figg. 3, 3 a (1881) (♀ ♂).*Hab.* ANTILLES, Cuba (*Finsch, in mus. Genavense*).][8. **Eurycotis subalata**, sp. n.♀. Statura et formis *E. mexicanæ*; nigra, capite rufo, ore et ocellis flavo-testaceis. Meso- et metanotum utrinque rufescentia. Elytra æque longa ac lata, metanotum tegentia, illum utrinque paulum superantia, in medio ejus marginem posticum liberantia, subquadrata, coriaceo-punctata; margine posteriore transverso, leviter obliquo, angulo externo rotundato, interno subrectangulo. Alæ tantum delineatae, corneae, laterales, angustae, metanoti longitudine, haud separatae. Pedes rufi, coxis fuscis; anticis valde punctatis. Lamina supra-analis incisa, angulis hebetatis. Cerci latiusculi, parum acuti.

Long. 18; elytr. 4, pronot. 5.75, latit. pronot. 8 millim.

*Hab.* SOUTH AMERICA, Colombia (*Mus. Genavense*).][9. **Eurycotis occidentalis**, Sauss.*Periplaneta occidentalis*, Sauss. Rev. et Mag. de Zool. xvi. p. 318 (1864) (♀); Mém. Mex., Blatt. p. 74. 19; Miss. Scient. Mex., Orthopt. p. 72. 2.*Hab.* ANTILLES.]

## PELMATOSILPHA, Dohrn.

*Pelmatosilpha*, H. Dohrn, Stett. ent. Zeit. 1887, p. 410.*Synopsis specierum.*

a. Elytra et alæ abdominis longitudine.

b. Castanea, staturæ mediocri (long. 27 millim).—[1. *alaris*, Sss. (Brasilia).] [Mém. Mex., Blatt. p. 75. 20, t. 1. fig. 10.]bb. Maxima, picea (long. 48 millim).—[2. *præstans*, Dohrn (Peruvia).] [Stett. ent. Zeit. 1887, p. 411.]aa. Minor, nigra; elytris abbreviatis; alis minutis infuscatis.—3. *villana*, sp. n.1. **Pelmatosilpha villana**, sp. n. (Tab. IV. figg. 41, 42.)♀. Nigra, nitida, formis sensim ut in *Eurycoti mexicana*; ocellis flavis, minimis; palpis nigris. Oculi maxime remoti. Elytra cornea abdominis segmenta 2 prima tegentia, margine suturali recto, margine costali ultra medium totus arcuatus (cum margine postico in arcum continuo), angulo apicali suturali minute