

name "Plectopterinae," so as to make it equivalent to the Anaplectinae (adopted instead of Ectobinae). In this way the names of the two Tribes will be based on their most typical and most perfectly corresponding genera.

*Synopsis generum.*

1. Majores. Corpus depressum. Caput valde prominulum, oculis maxime remotis. Lamina supra-analis ♀ semiorbicularis, ♂ brevissima, transversa. Cerci brevissimi. Elytra coriacea, venis longitudinalibus numerosis, crassiusculis. Pedes breves, tarsi crassiusculis. Ultimum segmentum ventrale ♀ latum, rotundatum; lamina infra-genitali ♂ rotundata, stylis lateralibus instructa. Habitus *Oxyhaloa buprestoides*.
2. Alæ campo appendiculari nullo; campo anteriore angusto; vena dividente frequenter arcuata; campo posteriore maximo, *amplectente*; vena axillari ramos radiatos numerosos et ad apicem emittente; vena ulnari recta, ramulos obliquos plurimos ad venam dividenter emittente. Ultimum segmentum ventrale ♀ in medio productum, rotundatum, utrinque sinuatum. Elytra coriacea, in requiete abdominis latera liberantia, venis distinctis, quadrato-reticulata, venulis costalibus arcuatis. Pronotum ellipticum. OXYHALOA, Br.
22. Alæ longissimæ; dimidia parte apicali parabolica, tota venosa, in requiete tota replicata; campo radiato minore, plicum transversum alæ haud superans. Ultimum segmentum ventrale ♀ breve, transverse arcuatum. Elytra subcornea, punctata, abdominis latera haud liberantia; venis obsoletis, venulis costalibus nullis. Pronotum ♀ trapezinum.—[DIPLOPTERA, Sss.]
11. Minores. Lamina supra-analis ♀ trigonalis, leviter incisa, ♂ transversa; cerci variabiles. Ultimum segmentum ventrale ♀ elongatum vel amplum, apice subcompressum. Lamina infra-genitalis ♂ stylis brevibus instructa. Alæ quando explicatæ apice campo appendiculari vel intercalato, replicato, haud venoso, instructæ. Pedes frequenter graciles.
2. Corpus glabrum. Antennæ setacæ. Pronotum ellipticum.
3. Corpus depressum. Cerci laminam supra-analem valde superantes. Alæ apice campo intercalato trigonali instructæ, apice rotundato; campo marginali angusto, venis costalibus numerosis obsito.
4. Elytra venis longitudinalibus tantum 2 (v. discoidali et v. media) (rare 1); vena media ramos obliquos ad marginem suturalem emittente. Venulæ costales parallelæ, pectinatæ. Area costalis baseos latiuscula ac brevis.
5. Elytra submembranacea vel coriacea, venosa, sulco anali distincto.
6. Corpus gracile; caput prominulum, oculis valde remotis. Elytra elongata, submembranacea, apice subacuminata, in requiete corporis latera valde superantia, venis longitudinalibus 2, ramis discoidalibus haud pectinatis. Abdomen elongatum, posterius attenuatum. Ultimum segmentum ventrale ♀ angustum, apice incisum. Cerci longissimi, apice angustissimi.—CHORISONEURA, Br.
66. Corpus ovatum, ellipticum. Caput parum prominulum. Elytra abdomen paulum superantia, vena longitudinali 1, ramis discoidalibus numerosis pectinatis. (Alarum campus appendicularis apicalis, parum vel haud intercalatus. Habitus generis *Anaplectæ*.)—[ANAPTYCTA, Br.]